

お得意様 各位

2020年2月  
三笠製薬株式会社

非ステロイド性消炎・鎮痛剤（COX - 2 選択的阻害剤）

**セレコキシブ錠 100 mg 「三笠」**

**セレコキシブ錠 200 mg 「三笠」**

製造販売承認取得のご案内

謹 啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、2020年2月17日に非ステロイド性消炎・鎮痛剤（COX - 2 選択的阻害剤）

セレコキシブ錠 100 mg 「三笠」 / セレコキシブ錠 200 mg 錠 「三笠」（一般名：セレコキシブ）の  
製造販売承認を取得しましたので、謹んでご案内申し上げます。

なお、新発売の詳細につきましては改めてご案内申し上げます。

今後とも、格別なるご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

セレコキシブ錠 100 mg 「三笠」 / セレコキシブ錠 200 mg 「三笠」の製品概要

販 売 名	セレコキシブ錠 100 mg 「三笠」 / セレコキシブ錠 200 mg 「三笠」
有 効 成 分	セレコキシブ
効 能 ・ 効 果	下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛 関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、腱・腱鞘炎 手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛
用 法 ・ 用 量	<b>関節リウマチ</b> 通常、成人にはセレコキシブとして1回 100~200mg を1日2回、朝・夕食後に経口投与する。 <b>変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、腱・腱鞘炎</b> 通常、成人にはセレコキシブとして1回 100mg を1日2回、朝・夕食後に経口投与する。 <b>手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛</b> 通常、成人にはセレコキシブとして初回のみ 400mg、2回目以降は1回 200mg として1日2回経口投与する。なお、投与間隔は6時間以上あけること。 頓用の場合は、初回のみ 400mg、必要に応じて以降は 200mg を6時間以上あけて経口投与する。ただし、1日2回までとする。
包 装	セレコキシブ錠 100mg PTP：100錠、140錠、500錠 パラ：300錠 セレコキシブ錠 200mg PTP：100錠、140錠 パラ：300錠
使 用 期 限	3年
規 制 区 分	劇薬、処方箋医薬品 <sup>※</sup> ※注意—医師等の処方箋により使用すること
貯 法	気密容器、室温保存
製 造 販 売 元	三笠製薬株式会社